

注意：2価ワクチンは薬事承認前であり、すべて予定の情報です

BA.1株対応の新型コロナウイルスの特性(令和4年8月17日時点)

キヤップ カラー 特性	ファイザー社 (従来株の 12歳以上用ワクチン)	ファイザー社 (従来株/オミクロン株の 2価ワクチン)	ファイザー社 (従来株/オミクロン株の 2価ワクチン)	モデルナ社 (従来株/オミクロン株の 2価ワクチン)	モデルナ社 (従来株/オミクロン株の 2価ワクチン)
希釈	生理食塩水1.8mLで希釈	希釈不要	希釈不要	希釈不要	希釈不要
接種量	初回(1・2回目): 0.3mL 追加(3回目以降): 0.3mL	追加(3回目以降): 0.3mL	初回(1・2回目): 0.5mL 追加(3回目以降): 0.25mL	追加(3回目以降): 0.5mL	追加(3回目以降): 0.5mL
1バイアル の単位	6回分(特殊な針・シリンジ) 5回分(一般の針・シリンジ)	6回分(特殊な針・シリンジ)	(初回) 10回分 (追加) 15回分以上	5回分	5回分
最小流通単位 (一度に接種会 場に配送される 最小の数量)	195バイアル (特殊な針・シリンジを用いる 場合は1,170回接種分、一般的 な針・シリンジを用いる場合は 975回接種分)	195バイアル (特殊な針・シリンジを用いる 場合は1,170回接種分) ※195バイアル入った1箱の大き さは従来株のワクチンと同じ	10バイアル (初回: 100回接種分) (追加: 150回以上接種分)	10バイアル (追加: 50回接種分) ※10バイアル入った1箱の大き さは従来株のワクチンと同じ	10バイアル (追加: 50回接種分) ※10バイアル入った1箱の大き さは従来株のワクチンと同じ
保管温度	-75°C±15°C: 12か月 -20°C±5°C: 14日 ※1回に限り、再度-90°C～ -60°Cに戻して保存可能 2～8°C: 1か月	-75°C±15°C: 12か月 -20°C±5°C: 不可 2～8°C: 10週	-20°C±5°C: 9か月 2～8°C: 30日(※) ※9か月の有効期間中に限る	-20°C±5°C: 9か月 2～8°C: 30日(※) ※9か月の有効期間中に限る	-20°C±5°C: 9か月 2～8°C: 30日(※) ※9か月の有効期間中に限る
備考	・冷蔵庫で解凍する場合、解凍 及び希釈を1か月以内に行う (解凍後の再凍結は不可) ・室温で解凍する場合は、解凍 及び希釈を2時間以内に行う (解凍後の再凍結は不可) ・希釈後、室温で6時間以内に 使用する(希釈後に凍結する ことは不可)	・ 24時間以内(一度針を刺した 後は12時間以内に使用、解凍 後の再凍結は不可)	【一度針をさしたもので以降】 2～25°Cで12時間 (解凍後の再凍結は不可)	【一度針をさしたもので以降】 2～25°Cで12時間 (解凍後の再凍結は不可)	【一度針をさしたもので以降】 2～25°Cで12時間 (解凍後の再凍結は不可)

※赤字下線部分は既存の製剤と異なる部分