

注意：6か月から4歳用ワクチンは薬事承認前であり、すべて予定の情報です

ファイザー社ワクチン（オリジナル株の1価ワクチン）の特性（令和4年●月●日時点）

キャップ カラー 特性	ファイザー社 （オリジナル株の 12歳以上用ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株の 5歳から11歳用ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株の 6か月から4歳用ワクチン）
希釈	生理食塩液1.8mLで希釈	生理食塩液1.3mLで希釈	生理食塩液2.2mLで希釈
接種量	初回（1・2回目）：0.3mL 追加（3回目以降）：0.3mL	初回（1・2回目）：0.2mL 追加（3回目）：0.2mL	初回（1・2・3回目）：0.2mL
抗原量	オリジナル株30μg	オリジナル株10μg	オリジナル株3μg
1バイアル の単位	6回分（特殊な針・シリンジ） 5回分（一般的な針・シリンジ）	10回分（特殊な針・シリンジ）	10回分（特殊な針・シリンジ）
最小流通単位 （一度に接種会場 に配送される最小 の数量）	195バイアル （特殊な針・シリンジを用いる場合は 1,170回接種分、一般的な針・シリン ジを用いる場合は975回接種分）	10バイアル （100回接種分）	10バイアル （100回接種分） ※10バイアル入った1箱の大きさは従来 の5～11歳用ワクチンと同じ
保管温度	-75°C±15°C：15か月 -20°C±5°C：14日 ※1回に限り、再度-90°C～-60°Cに 戻して保存可能 2～8°C：1か月	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・冷蔵庫で解凍する場合、解凍及び希釈を1か月以内に行う（解凍後の再凍結は不可） ・室温で解凍する場合は、解凍及び希釈を2時間以内に行う（解凍後の再凍結は不可） ・希釈後、室温で6時間以内に使用する（希釈後に凍結することは不可） 	<ul style="list-style-type: none"> ・室温では24時間以内に使用する（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可） 	<ul style="list-style-type: none"> ・室温では24時間以内に使用する（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可）

※赤字下線部分は5歳から11歳用の製剤と異なる部分

38

注意：BA.4/5株を含む2価ワクチンは薬事承認前であり、すべて予定の情報です

ファイザー社ワクチン（オミクロン株対応2価ワクチン）の特性（令和4年●月●日時点）

キャップ カラー 特性	ファイザー社 （オリジナル株の 12歳以上用ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株・BA.1株の 2価ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株・BA.4/5株の 2価ワクチン）
希釈	生理食塩液1.8mLで希釈	希釈不要	希釈不要
接種量	初回（1・2回目）：0.3mL 追加（3回目以降）：0.3mL	追加（3回目以降）：0.3mL	追加（3回目以降）：0.3mL
抗原量	オリジナル株30μg	オリジナル株15μg + BA.1株15μg = 30μg	オリジナル株15μg + BA.4/5株15μg = 30μg
1バイアル の単位	6回分（特殊な針・シリンジ） 5回分（一般的な針・シリンジ）	6回分（特殊な針・シリンジ）	6回分（特殊な針・シリンジ）
最小流通単位 （一度に接種会場 に配送される最小 の数量）	195バイアル （特殊な針・シリンジを用いる場合は1,170 回接種分、一般的な針・シリンジを用い る場合は975回接種分）	195バイアル （1,170回接種分） ※195バイアル入った1箱の大きさは従来 株のワクチンと同じ	195バイアル （1,170回接種分） ※195バイアル入った1箱の大きさは従来 株のワクチンと同じ
保管温度	-75°C±15°C：15か月 -20°C±5°C：14日 ※1回に限り、再度-90°C～-60°Cに 戻して保存可能 2～8°C：1か月	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・冷蔵庫で解凍する場合、解凍及び希釈を1か月以内に行う（解凍後の再凍結は不可） ・室温で解凍する場合は、解凍及び希釈を2時間以内に行う（解凍後の再凍結は不可） ・希釈後、室温で6時間以内に使用する（希釈後に凍結することは不可） 	<ul style="list-style-type: none"> ・室温では24時間以内に使用する（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可） 	<ul style="list-style-type: none"> ・室温では24時間以内に使用する（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可）

※赤字下線部分はBA.1株とBA.4/5株の製剤で異なる部分
（販売名にもBA1とBA4-5が入って、見分けられる）

39